



令和6年

多気営農センターたより



平素は、農協事業に格別なるご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

令和6年度多気営農センターは、奥伊勢営農センターを統合、並びに多気営農センター丹生店を閉店し、多気町と大台町全域を活動地域とした新たな多気営農センターになりました。

現在、業務における運営方法を整理しておりますが、各地域の商品の注文方法、配達方法、引取り方法など、運営方法が整理でき次第、『営農だより』『広報紙はばたき』『各施設への貼り出し』などを活用し、ご案内させていただきます。

組合員の皆様には大変ご不便をお掛けしますが、ご用件は多気営農センターでお伺いさせていただきますので、ご連絡お願い申し上げます。

多気営農センター 電話番号 0598-39-6170

※旧奥伊勢営農センターと多気営農センター丹生店に電話すると多気営農センターに転送電話されます。(一定期間)

今後とも職員一同一層サービスの向上に努めて参りますので、よろしくお願い申し上げます。

○商品の注文、配達、引取りについて（基本運営）

① 当用商品の注文は、多気営農センターで承ります。

また各種予約注文書については、多気営農センター、多気営農センター川添店の店舗で承り、旧奥伊勢営農センター、旧多気営農センター丹生店、旧奥伊勢営農センター大台東部店、大台宮川支店に注文書回収BOXを設置し、定期的に回収させていただきます。

② 当用商品の配達は、以下の曜日で各地域に配達に伺います。

注文受付：月曜日の午後～水曜日午前まで分 ⇒木曜日に配達

水曜日の午後～翌週の月曜日午前までの分⇒翌週の火曜日に配達

※1 配達の件数や数量が多い場合は、翌日配達になる場合があります。

※2 領内・大杉谷の地域は、木曜日のみ配達になります。

※3 天候の変化や急を要する場合は、その都度ご相談させていただきます。

③ 予約・当用商品の引取について

既に3月までにご注文頂いた商品を引取る場合は、現在その都度対応をさせていただきますので、多気営農センターまでご連絡をお願い申し上げます。

○多気営農センター4～5月の営業時間について

平日 ⇒ 午前8時45分～18時まで

土日祝 ⇒ 午前8時45分～12時まで



お茶 下記を参考にしてください。

1. カンザワハダニ

この時期は、日当たりの良い裾部や園の南側に多くいます。気温が上がってくるとカンザワハダニの活動も活発になり、発生が増える可能性があります。防除をする場合は、裾葉や葉裏にもかかるようにしましょう。

2. チャノホソガ

新芽に水滴状の卵がついていないかチェックしましょう。卵期間は3～6日ふ化してから三角の巻き葉を巻くまでの幼虫期間は7～16日程度です。三角に巻いた葉の中の幼虫のフンによって品質が著しく低下します。摘採予定日と発生量、農薬の摘採前日数に注意して防除しましょう。

病虫害名	使用薬剤名	濃度	摘採日数	回数	備考
カンザワハダニ チャトゲコナジラミ	バロックフロアブル	2,000倍	14日前	1回	萌芽期
チャノホソガ	ファルコンフロアブル	4,000倍	7日前	2回	開葉期

上記以外のダニ剤！ ダニサラバフロアブル 1,000～2,000倍/7日前/2回

※摘採日数がぎりぎりの場合はダニサラバの使用が有効です。

※栽培履歴の記帳を徹底しましょう。栽培履歴の無いお茶は、市場では販売できません。

水稻除草剤 下記を参考にしてください。



除草剤散布後は、5日間湛水状態(5～6cm)を保ち田面が露出しないようにします。また散布後7日間は落水、かけ流しは控え、入水する場合は、静かに行います。省力処理剤(ジャンボ剤等)は、拡散性に優れていますが強風時の使用は避けます。

また、季節予報では4月の気温は高いと予想されています。気温が高いと雑草の発生時期及び生育が早くなるので、除草剤の散布は遅れないように適期散布を心がけて下さい。ただし田植え後、植え傷みのある場合や苗の活着が悪い場合は、極端な早期散布は避け、稲の生育を考慮し除草剤散布をやや遅らせる事も検討してください。

おすすめ除草剤

初中期一発処理剤	ラオウジャンボ	処理最適期	移植直後 ～10日
イモ系(クログワイ)	ゼータジャガージャンボ	処理最適期	移植後 3～10日
ヒエ専用剤	クリンチャージャンボ	処理最適期	移植後15～35日
体系防除(初期剤+中期剤)	マーシェットジャンボ	処理最適期	移植後 1～3日
	フルスコアZジャンボ	処理最適期	移植後20～30日



肥料・農薬など栽培に関するお問い合わせは



多気営農センター 39-6170 または各営農指導員携帯へご相談ください。