

令和8年

# 多気営農センター たより 3月号



## お知らせ



- ・ 3月31日は決算棚卸のため、多気営農センター店舗は休業とさせていただきます。ご理解よろしくお願い致します。

### ☆多気営農センター（店舗）3月の営業時間のご案内☆

#### ◎平日の営業

- ・ 3月 2日（月）～13日（金） 8：45～17：00
- ・ 3月16日（月）～ 9月末まで 8：45～18：00

#### ◎土、日曜日の営業

- ・ 3月1日（日）～3月21日（土）までの土日祝は休業とさせていただきます。
- ・ 3月22日（日）、28日（土）、29日（日）午前営業

営業時間 8：45～12：00

尚、3月22日（日）～5月10日（日）は農繁期対応として土、日、祝日の営業を8時45分～12時00分とさせていただきます。




## 土壌診断をしましょう！



豊作のまず手始めは土作りです。人間と同じで作物の生活環境を整えることで作物を元気に育てることができます。これまでに土壌診断をされた方も、一度もしたことがない方も、ぜひ作物植付前には土壌診断を実施してみてください。

- ・ 提出方法 . . . 多気営農センターにある専用の土壌診断袋に細かく砕いて乾かして土を入れてください。（診断は有料となります）
- ・ 提出先 . . . 多気営農センター
- ・ 結果 . . . 診断に約2～3週間かかります。結果が出れば連絡致します。



営農指導員たより



3月



**水稻育苗管理** 下記を注意し管理してください。



- ① 育苗器をお使いの方は使用前に温度計が壊れていないか、温度がきちんと上がるか一度確認をしてから使用してください。  
(一年ぶりに使用すると機械に不具合が生じている場合があります。)
- ② ハウス内にて使用する緑化用の育苗シートが汚れや破れていると太陽光が入り緑化がうまくいかない場合があるので注意が必要です。  
(銀色の育苗シートは表面のコーティングが剥げると太陽光が透過し、苗が白化するのでご使用前に一度広げて確認してください。)
- ③ ハウスの温度管理は、昼間 25℃、夜間 10℃を目標に温度調整をしましょう。灌水は過湿にならないように管理し、夕方の水やりは避けましょう。  
(水が多く夜温が下がりすぎると根張りが悪くなる原因となるので気をつけて下さい。)  
今後、3月～5月にかけての三重県の平均気温は高い確率60%と予想されています。ハウス内の温度が高温にならないように気を付けてください。ハウス内温度が高過ぎるとヤケ苗の発生リスクが高くなるので注意してください。

**かき** 今月より基幹防除が始まります。防除暦は、あくまで目安です。気象条件、園地の病害虫発生状況に応じて効率よい防除を心がけましょう。

3月下旬基幹防除 黒星・うどんこ病・フジコナカイガラムシ 石灰硫黄合剤 10倍  
青い芽が展開するまでに散布。

カイガラムシ多発樹には、スタークル顆粒水溶剤またはアルバリン顆粒水溶剤で樹幹塗布処理を行いましょう。

薬剤 1g に対し水 1cc の割合で希釈し主幹から主枝の粗皮を剥いだ部分に塗布します。

使用時期 発芽前～発芽期 使用量 樹あたり 20～40g

塗布処理をすることにより長期的に効果が持続します。

～果樹（柿・みかん）の防除農薬年間予約承っております！～

柿・みかんの基幹防除剤として、栽培こよみに載せております農薬が少し安くご購入いただけますので、ぜひこの機会にご注文下さい。

◎ 詳しくは多気営農センター 39-6170 までお問い合わせください。