


令和 8 年

多気営農センター たより 6月号


STOP！白アリ被害

突然ですが、皆さん白アリってご存知ですか？「白い色をした無害なアリじゃないの？」何をおっしゃいます！？無害などとんでもありません！



・シロアリとは、木造家屋などに棲みつき木材を食い荒らし、さらには強靱な大アゴでコンクリート・鉛までも噛み砕き家屋に甚大な被害を及ぼし、最悪家屋の倒壊へと繋がる恐れがあります。

- こんな症状がでたら・・・すぐ JA へ
- ・羽アリまたは羽アリの羽が落ちている
 - ・床がゴワゴワする
 - ・木の柱がボロボロ



シロアリは JA へお任せください！！

床下の無料調査

安心の5年保障

丁寧な薬の散布

お問い合わせは、多気営農センターまで！



秋冬野菜新規生産者募集！！



白菜、なばな、キャベツ、ブロッコリーなど、秋冬野菜の作付準備の時期となります。上記品目の秋冬野菜苗の取り纏めも合わせて行いますので、新規作付に興味がある方は多気営農センターまでご連絡をお願いします。また、その他の野菜に関しても栽培にご興味がある場合は営農指導員にお問い合わせください。

お知らせ

☆令和 8 年産用米袋の申込期日は6月 19 日(金)となります。

JA 出荷用袋 114 円(税込) 保有米袋 102 円(税込)

肥料・農薬など栽培に関するお問い合わせは

多気営農センター 39-6170 まで 担当の営農指導員が対応致します。



営農指導員たより



これからの時期、高温・多湿な気候が続く、病害虫が発生しやすくなりますので、防除管理が重要となります。適期防除に努めましょう。

水稻



～雑草防除～

今の時期に抑えきれなかった雑草でお困りでしたら、下記の薬剤を参考に防除をしましょう。

- ロイヤント乳剤・・・移植後20日～ノビエ5葉期（但し収穫45日前）
10a当たり 200ml/100L 落水散布・ごく浅く湛水して散布
- クリンチャーEW・・・移植後20日～ノビエ6葉期（但し収穫30日前）
10a当たり 100ml/100L 湛水散布・落水散布

～本田防除～

これからは気温・湿度ともに高い時期となってきます。高温多湿条件が続くといもち病の発生も懸念されます。早期発見・早期防除に努めましょう。下記の防除を参考に防除をしましょう。

- ブラシンフロアブル いもち病 1,000倍 100L/10a 収穫7日前
- オリブライト豆つぶ いもち病 250g/10a 収穫45日前



かき・みかん



開花も終わり、今月は生理落果期に入ります。花弁が実に付着しているとカビ（灰色カビ病等）の発生を助長しますので、着果数・生理落果などに応じた適期防除をしましょう。

～柿 基幹防除～

- 6月中下旬 落葉病・・・ジマンダイセン水和剤（600倍）
カイガラムシ・アザミウマ・・・コルト顆粒水溶剤（3,000倍）
- ※うどんこ病多発園では、ジマンダイセン水和剤の代わりにストロビーDF（3,000倍）の散布がおすすめです。
- ※雨が続くようであれば、雨前、雨間にトップジンM水和剤（1,500倍）を追加防除しましょう。

～みかん 基幹防除～

- 6月中下旬 そうか病・黒点病・・・ジマンダイセン水和剤（600倍）
- ハダニ類・・・ハーベストオイル（150倍）
- カイガラムシ類・・・モスピラン顆粒水溶剤（4,000倍）
- ※前年チャノホコリダニが多発した園地では、サンマイル水和剤（3,000倍）を追加散布がおすすめです。

農薬はラベルをよく読んで使用しましょう。

肥料・農薬など栽培に関するお問い合わせは

多気営農センター39-6170 または各営農指導員携帯へご相談ください。