



令和7年多気営農センターたより



平素は、JA事業に格別なるご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

令和7年産水稻については、4月中旬頃より田植えが開始され、こちらの便りがお手元に届く頃には、大半の方が田植えを終えられた事かと思えます。田植え後は、大きな被害なく概ね順調に生育しているように感じられます。

また令和7年産の1番茶の摘採は、4月20日過ぎから開始されました。1番茶摘採後の病害虫管理と園地管理について記載させていただきます。

水稻 雑草防除

初・中期一発の除草剤を使用後、雑草が残っている圃場では下記薬剤を参考に、中期防除に努めてください。

セカンドショットSジャンボ⇒移植後14日～ノビエ3.5葉期（収穫45日前まで）
20パック/10a

クリンチャージャンボ⇒移植後7日～ノビエ4葉期（収穫30日前まで）20パック/10a

※上記記載の適用雑草名、使用時期等は登録内容の一部抜粋です。

※その他多数の中期、後期除草剤を取り揃えておりますので、ご相談ください。

水管理

田植え後30日を目安に溝切りの実施。

無効分げつをなくす為に中干しを行います。中干しは田植え後、40～50日頃を目安に5～7日程度、実施してください。

（田面に小さな亀裂が生じ、軽く足跡が付く程度）中干し後は、間断灌水にします。



登熟向上資材

田植え後30～45日を目安に『けい酸加里プレミアム34』を10aあたり30～40kg投入することにより、登熟向上、乳白粒の軽減等の効果が期待できます。

お茶 管理

1番茶摘採後は速やかに整枝を行って下さい。芽の状況に応じて2回目の整枝を行って下さい。また茶園更新の中切りを行う場合は5月中旬頃がおすすめです。

園地防除

2番茶前は気温の上昇によりダニ・ハマキ等の発生が懸念されますので、防除の徹底をお願いします。クワシロカイガラムシとチャトゲコナジラミが発生・多発した茶園では、コルト顆粒水和剤を散布すると両方の害虫に効果があり、防除を軽減できます。

アグリメック ⇒ カンザワハダニ、サビダニ 1000倍/7日 1回

ディアナSC ⇒ チャノホソガ、チャノコカクモンハマキ 3000倍/1日 1回

コルト顆粒水和剤 ⇒ クワシロカイガラムシ、チャトゲコナジラミ、チャノハダニ 2000倍/7日 2回

オンリーワンフロアブル ⇒ 炭疽病、もち病、新梢枯死病 2000倍/7日 } 混用

ウララDF ⇒ チャノハダニ、チャノミドリハダニ 1000倍/7日 }



肥料・農薬など栽培に関するお問い合わせは

多気営農センター 39-3150 まで 担当の営農指導員が対応致します。



営農フェア

6月13日(金)の1日限り 9時~16時

開催場所:JA多気郡 多気営農センター

【肥料】数量限定

- 菜果の匠(有機配合)
- オール14
- 燐硝安加里S646
- 牛ふん

【農薬】

水稻除草剤・本田防除剤
茎葉除草剤 等
柿・みかん6月の防除剤

肥料・農薬
特価販売

価格当日発表!



営農相談
コーナー

その他
開催内容

- 土壌診断
- 肥料設計
- 農薬相談 等

お気軽にご相談ください

- シロアリ相談会
- 住宅リフォーム相談会
- 不要家財整理等の相談会

多気郡多気町四神田340-2
JA多気郡多気営農センター
0598-39-6170